
El diagnòstic de la malformació de Chiari

Clara Vivas
Institut Verdaguer
2n de Batxillerat
Curs 2024-25

INTRODUCCIÓ

- Aquest treball de recerca tracta sobre la malformació de Chiari, una malaltia poc coneguda i infradiagnosticada.
- Analitza com els tipus de símptomes influeixen a l'hora de fer el diagnòstic.
- Aquest treball està relacionat amb l'objectiu 3 (salut i benestar). A més, parla sobre el dret que té el pacient a un diagnòstic adequat i a rebre la informació sobre a malaltia que pateix.



3 SALUT I BENESTAR


OBJECTIU DE RECERCA

Analitzar si el tipus de símptomes (físics, psicològics o cognitius, o combinats) influeixen en la rapidesa i prioritat de la derivació a un neuròleg en pacients amb Malformació de Chiari.

MÈTODE

- Investigació de la malaltia durant marc teòric.
- Enquestes a metges de capçalera de diversos CAPs.
- Dues entrevistes, una a un pacient expert i president de FEMACPA, i l'altra a una neurocirurgiana de l'hospital de Vall d'Hebron.
- Analitzar els resultats de l'enquesta i l'entrevista, i relacionar-los.






RESULTATS


Derivació a la prova

Els casos amb símptomes combinats van obtenir més derivacions a la prova correcta que era la ressonància magnètica.




Derivació a l'especialista

Els casos amb símptomes combinats van obtenir més derivacions a l'especialista correcte, que era el neuròleg.



Possibles diaganòstics

Els casos amb símptomes combinats van ser els que van obtenir més diagnòstics correctes dels metges.



Entrevistes

- Segons la gravetat dels símptomes s'operen i es deriven abans.
- Molts pacients primer reben un diagnòstic psiquiàtric abans de rebre el diagnòstic correcte de malformació de Chiari.
- Cal fer xerrades informatives als professionals.
- La cirurgia frena la progressió, no cura la malaltia.
- La malaltia es pot diagnosticar entre 3 i 4 dies o entre 3 i 4 anys.

CONCLUSIONS

- La meva hipòtesi queda parcialment rebutjada perquè els casos amb símptomes combinats es deriven més ràpidament. No obstant, els casos amb símptomes físics greus es deriven amb més prioritat.
- La majoria de derivacions a psiquiatria es donen en els casos amb símptomes psicològics o cognitius.
- Els diagnòstics erronis més freqüents són fibromiàlgia, problemes psicològics i esclerosi múltiple.
- Quants més símptomes té el pacient, amb més prioritat és derivat correctament a la prova i a l'especialista.

FEMACPA
Federación Española de Malformación de Chiari y Patologías Asociadas

Vall d'Hebron
Barcelona Campus Hospitalari

AGRAÏMENTS

Gràcies al president de FEMACPA Domingo Ponce que em va inspirar per fer el treball i pel contacte que em va proporcionar: la Dra. Mª Antònia Poca a qui també li agraeixo que participés a l'entrevista. També, gràcies a la meva mare i al meu pare per haver-me recolzat i ajudat al llarg de tot el treball, i a la meva tutora de recerca la M.José March, professora de Física i Química per tot el seguiment que ha dedicat.

BIBLIOGRAFIA

- Pàgina web de la federació FEMACPA: *https://femacpa.com/chiari-que-es/*
- Pàgina web utilitzada per buscar vocabulari: *https://medlineplus.gov/spanish/*